


ETAPAS DE DESARROLLO DE LAS PULGAS



Las formas inmaduras de las pulgas presentes en el medio ambiente en el momento de aplicación (huevos, larvas y pupas) pueden continuar su ciclo y, por eso, ocurre la reinfestación de los animales después de la aplicación.

Por lo tanto, para reducir la infestación del medio ambiente, es necesario hacer una completa limpieza y aspiración del ambiente en que se encuentra el animal, incluso mantas y capas, utilizándose los productos adecuados para esos efectos.

FRONTLINE® Plus Gatos Boehringer Ingelheim
1 pipeta de 0,5 mL

INDICACIONES

Para el control y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*) y piojos (*Felicola subrostratus*) en gatos. Se recomienda la aplicación complementaria de **FRONTLINE® PLUS** en la Dermatitis Alérgica por Pulgas. En estos casos se recomienda la aplicación mensual.

FRONTLINE® PLUS controla la reinfestación al eliminar a pulgas y piojos durante 5 semanas luego de su aplicación.

FRONTLINE® PLUS no sólo elimina a la pulga adulta antes de que oviposite, sino que también impide el desarrollo a pupas de los huevos y larvas resultantes de pulgas adquiridas durante 5 semanas y hasta 6 semanas luego de su aplicación.

Para mayor eficacia del producto, se recomienda aplicar simultáneamente a todos los perros y gatos de la casa.

USO EXTERNO, MEDIANTE APLICACIÓN CUTÁNEA

Aplicar 1 pipeta de 0,5 mL por gato. (Fipronil: 5 mg/kg; (S)-metopreno: 6 mg/kg).

• **Modo de Aplicación:** cortar la pipeta a nivel de la parte superior marcada, vaciar el contenido de la misma directamente sobre la piel, separando el pelo, preferentemente en 2 puntos, en la base del cuello y entre las dos escápulas, para evitar el lamido.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y EFECTOS NO DESEADOS

- Sólo para uso externo en gatos.
- evitar el contacto con los ojos del animal.
- evitar tocar el contenido con los dedos.
- lavarse las manos con agua y jabón después de la aplicación.
- tras exposición accidental en los ojos, lavar con agua.
- no fumar, beber ni comer durante la aplicación.
- no debe almacenarse con productos alimenticios.
- no tocar a los animales hasta que el pelo esté seco.
- Aplicar en un área donde el animal no pueda lamerse y asegurar que los animales no se laman unos a otros.
- Si el animal se lamiese podría observarse un breve período de hipersalivación debido únicamente a la naturaleza del excipiente.
- Este producto puede causar irritación de membrana mucosa, piel y ojos. Se debe evitar el contacto del producto con la boca, piel y ojos.
- Rara vez pueden observarse reacciones transitorias en el sitio de aplicación (descamación, pérdida de pelo local, picazón, enrojecimiento) o picazón generalizada o pérdida de pelo.
- Tras la administración del medicamento también se ha podido observar salivación excesiva, signos nerviosos reversibles (sensibilidad a la estimulación incrementada, depresión, otros signos nerviosos), vómitos o síntomas respiratorios.

- No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.
- Si la solución se impregnara en el pelo, el aspecto apelmazado resultante desaparecerá en aproximadamente 24 horas.
- Descartar las pipetas vacías de manera segura.
- No utilizar en gatitos con menos de 8 semanas de edad o 1 kilo de peso.
- No utilizar en animales enfermos o convalecientes.
- No utilizar en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas incluso con resultado de muerte.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DE PRODUCTO SIN UTILIZAR O EL MATERIAL DE DESECHO

Todo medicamento no utilizado o los residuos derivados del mismo deben eliminarse de manera segura para el medio ambiente. Fipronil y (S)-metopreno pueden afectar de forma adversa a organismos acuáticos. No eliminar producto o envases en cursos de agua. Envases vacíos pueden ser descartados junto con los desechos domésticos. Contactar a la empresa importadora o a empresas especializadas en la eliminación de residuos para recibir las recomendaciones en la disposición de productos vencidos o no utilizados.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Conservar el envase original entre 15°C y 30°C en lugar seco y alejado del calor.

En Uruguay: Entregar el envase vacío en el centro de acopio más cercano.

INFORMACIÓN ADICIONAL

FRONTLINE® PLUS puede utilizarse en hembras en gestación y en lactación y en gatitos desde las 8 semanas de edad. El producto tarda 24 horas en extenderse por el pelo del animal. La duración de la eficacia dependerá también de la carga parasitaria. Si hay alto riesgo de reinfestación con pulgas se recomienda aplicación mensual. En áreas con infestaciones menos severas, **FRONTLINE® PLUS** puede ser aplicado cada 6 semanas.

PRESENTACIONES

1 pipeta de plástico conteniendo 0,5 mL c/u.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene: Fipronil: 10% - (S)-metopreno: 12% - vehículo csp: 100,0%.

- Fipronil 5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometilo)fenilo]-4-[(1R,S)-(trifluorometilo) sulfonil]-1-H-[pirazole-3-carbonitrilo].

(S)-metopreno: 11 metoxi-3,7,11-trimetilo-2,4-éster 1 - metiletilo ácido dodecadienoico.

PRODUCTO MODERADAMENTE TÓXICO

En caso de ingestión accidental provocar el vómito y llamar inmediatamente al médico. Síntomas de intoxicación: no son específicos del producto, pero pueden ocurrir manifestaciones neurológicas, excitación, temblores, sedación excesiva. No se conoce antídoto específico.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

En Argentina: Buenos Aires - Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel. 0800-333-0160.

En Uruguay: CIAT - Hospital de Clínicas: Tel. 1722.

Pulgas: Etapas y Fases del problema

Hasta hoy han sido identificadas más de 2200 especies y subespecies de pulgas. Mientras algunas son específicas de determinados huéspedes, otras parasitan varios tipos de animales. El ciclo de vida de la pulga se divide en 4 estadios: huevo-larva-pupa y adulto y cada fase se caracteriza por aspecto, biología y ecología diferentes.



Imagine la pirámide de estadios de la pulga como si fuera un enorme iceberg. Las pulgas adultas (5% del problema) son apenas la punta visible de ese iceberg. La parte invisible corresponde a huevos, larvas y pupas (95% del problema) esparcidos en el medio ambiente.

HUEVO

A pesar de ser depositados en el pelaje del huésped, los huevos no se adhieren ni a la piel ni a los pelos y caen al ambiente. Por lo tanto, pueden ser encontrados en cualquier lugar por donde pase el animal infestado por pulgas.



LARVA

Luego de eclosionadas, las larvas pasan por 2 mudas mientras crecen y después se transforman en pupas. Las larvas de pulgas se mueven por el piso y evitan la luz. Por eso son más encontradas en alfombras, zócalos, cunas y camas de los animales.



PUPA

La larva madura se transforma en pupa (que puede sobrevivir en el ambiente por más de 6 meses) dentro de un capullo. Por ser éste viscoso, el capullo es rápidamente cubierto con residuos del ambiente que ayudan a camuflarlo y protegerlo aún más.




PULGA ADULTA

Al contrario de la larva, las pulgas adultas se mueven en dirección a la luz. Las pulgas recién emergidas se mueven a la parte superior de los pelos de las alfombras y de la cama de las mascotas aguardando un hospedador. También pueden subir a los tapizados de sillones, sofás, patas de sillas, cortinas y otros muebles, siendo este estadio altamente resistente a los parasitocidas en general.



FRONTLINE® Plus Gatos Boehringer Ingelheim

INSTRUCCIONES DE USO



1. Cortar la punta superior marcada de la pipeta.



2. Aplicar el contenido de la pipeta en el lugar indicado.



3. Colocar el producto directamente sobre la piel, abriendo el pelaje, en 2 ó 3 puntos.

No bañar al gato 48 horas antes o después de la aplicación.
DOSIS: 1 pipeta de 0,5 mL por gato.

ATENCIÓN: LEA EL RÓTULO

©Frontline es una Marca del Grupo Boehringer Ingelheim.

FRONTLINE® Plus Boehringer Ingelheim
(Fipronil 10%, (S)-metopreno 12%)
Contra pulgas, huevos y larvas de pulgas, y piojos

Gatos Solución Tópica
1 pipeta de 0,5 mL

Importado y distribuido por: Argentina: Boehringer Ingelheim Animal Health Argentina S.A. Cazadores de Coquimbo 2841, 2° piso, B1605AZE - Muro, Buenos Aires, Argentina 0800-444-2952 #SENASA Cert. N° 02-077 - Venta libre en Veterinarias Dir. Técnico Dir. Ana Lia Cassano - Médica Veterinaria, MP N° 6348

Uruguay: Boehringer Ingelheim Animal Health Uruguay S.A. - Dr. Luis Bonavita 1260 Oficina 2601 WTC 14, Montevideo, Tel: 2923 53 15 Reg. MGAP A-3286 - Venta libre en Veterinarias Dir.

Técnico: Dr. Diego Irazoqui

Chile: Boehringer Ingelheim Ltda. Av. Bldora Goyenechea 3000, piso 18, Las Condes, Santiago de Chile.

Bajo licencia de Boehringer Ingelheim (Vetmedica GmbH, Alemania).

Call center: 800 261 008

222 640 000 (desde celulares)

Reg. SAG N°1611

Venta Directa

Paraguay: Aproximadamente Consultas Petróleo Reg. SENASA 2012/2010

Bolivia: Central de Insumos MVS S.R.L. Reg. SENASA 01/01/00262/08

Reg. SENASA 01/01/00262/08

Uso Veterinario
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



Paraguay: Aproximadamente Consultas Petróleo Reg. SENASA 2012/2010

Bolivia: Central de Insumos MVS S.R.L. Reg. SENASA 01/01/00262/08

Reg. SENASA 01/01/00262/08

Fabricado por Meril S.A.S., Avenida Tony Garnier 69007, Lyon, Francia. 7 730997 410607

"Conservar a temperatura entre 15°C y 30°C, en lugar seco y alejado del calor"