


ETAPAS DE DESARROLLO DE LAS PULGAS



Las formas inmaduras de las pulgas presentes en el medio ambiente en el momento de aplicación (huevos, larvas y pupas) pueden continuar su ciclo y, por eso, ocurre la reinfestación de animales después del tratamiento.

Por lo tanto, para reducir la infestación del medio ambiente, es necesario hacer una completa limpieza y aspiración del ambiente en que se encuentra el animal, incluso mantas y capas, utilizándose los productos adecuados a esos efectos.

Para más informaciones, consulte a su veterinario.

FRONTLINE
SPOT ON

Boehringer
Ingelheim

1 pipeta de 0,5 mL

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene: Fipronil: 10 g - Butilhidroxianisol: 0,02 g - Butilhidroxitolueno: 0,01 g - Excipiente c.s.p: 100 mL.

INDICACIONES

Para el control y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*) y piojos (*Felicola subrostratus*) en gatos.

FRONTLINE® SPOT ON elimina la pulga adulta antes de que oviposite y controla la reinfestación. Su actividad persistente controla la reinfestación al eliminar pulgas y piojos durante por lo menos 5 semanas.

Para mayor eficacia del producto, se recomienda aplicar simultáneamente a todas las mascotas de la casa.

En los casos de Dermatitis Alérgica por Pulgas se recomienda la aplicación mensual.

USO EXTERNO MEDIANTE APLICACIÓN CUTÁNEA

Aplicar 1 pipeta de 0,5 mL por gato.

• **Modo de Aplicación:** cortar la pipeta a nivel de la parte superior marcada, vaciar el contenido de la misma directamente sobre la piel, separando el pelo, preferentemente en 2 puntos, en la base del cuello y entre las dos escápulas, para evitar el lamido.

Si la solución se impregnara en el pelo, el aspecto apelmazado resultante desaparecerá en aproximadamente 24 horas.

CONTRAINDICACIONES Y RECOMENDACIONES

• Si el animal se lamiese, podría observarse un breve período de

hipersalivación debido únicamente a la naturaleza del excipiente. • Sólo para uso externo en gatos. • Como en el caso de todos los insecticidas: - evitar tocar el contenido con los dedos - lavarse las manos con agua y jabón después de la aplicación - no fumar, beber ni comer durante la aplicación - no tocar los animales hasta que el pelo esté seco. • Mantener el producto fuera del alcance de los niños • Tirar la pipeta vacía con los residuos domésticos. • No debe almacenarse con productos alimenticios. • Conservar el envase original entre 15°C y 30°C en lugar seco y alejado del calor.

PRESENTACIONES

1 pipeta de plástico conteniendo 0,5 mL.

INFORMACIÓN ADICIONAL

FRONTLINE® SPOT ON puede utilizarse en hembras en gestación y lactación, en gatitos desde las 8 semanas de edad. No se recomienda bañar al animal durante las 48 horas anteriores y posteriores al tratamiento con **FRONTLINE® SPOT ON**. Sin embargo, los baños y champús posteriores a ese periodo no influirán en la duración del efecto protector contra pulgas y piojos. El producto tarda 24 horas en extenderse por el pelo del animal.

PRODUCTO MODERADAMENTE TÓXICO

En caso de ingestión accidental, provocar el vómito y llamar inmediatamente al médico.

Síntomas de intoxicación: no son específicos del producto pero pueden ocurrir manifestaciones neurológicas, excitación, temblores, sedación excesiva. No se conoce antídoto específico.


CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

Buenos Aires: Primer Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel. 0800-3330160
Servicio de Toxicología del Hospital Posadas: Tel. (011) 4658-7777
Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina (UBA): Tel. (011) 4508-3666
Centro Toxicología del Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez": Tel. (011) 4962-6666
Hospital Cullen de Santa Fe: Tel. 0342-4573357
Hospital "Julio Perrando" de Chaco: Tel. 03722-440127
Hospital Central de Mendoza: Tel. 0261-453554
Hospital del Niño Jesús de Tucumán: Tel. 0381-4247141
Hospital Regional de Neuquén: Tel. 0299-4490800
Hospital de Niños de Córdoba: Tel. 0351-4586406
Hospital de Niños de Catamarca: Tel. 03833-437652


FRONTLINE
SPOT ON

Boehringer
Ingelheim


INSTRUCCIONES DE USO



Cortar la punta superior marcada de la pipeta.



Aplicar el contenido de la pipeta en el lugar indicado.



Colocar el producto directamente sobre la piel, abriendo el pelaje, en 2 ó 3 puntos.

No bañar el gato en los 2 días antes y después de la aplicación.

©Marca registrada de Boehringer Ingelheim.

FRONTLINE
(Fipronil) **SPOT ON**
Contra pulgas y piojos

Gatos

1 pipeta de 0,5 mL

Solución para aplicación cutánea

Importado y distribuido por:
Boehringer Ingelheim
Animal Health Argentina S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841
Piso 2 (B1605AZE), Munro,
Buenos Aires, Argentina
Director Técnico:
Ana Lía Cassano
Médica Veterinaria
M.P.N° 6348
Línea gratuita para
consultas:
0800-444-2582

147505-004

SENASA
Cert. N° 96.467

Conservar a temperatura entre 15°C y 30°C, en lugar seco y alejado del calor

USO VETERINARIO

Elaborado en Francia.

Acondicionado en Brasil.

Venta libre en Veterinarias